

Quercus lamellosa

synonyma: Cyclobalanopsis fengii, Cyclobalanopsis lamellosa, Perytis lamellosa, Quercus imbricata, Quercus lamellata

čeleď: Fagaceae

oblasti: Bhútán, Nepál, Sikkim

Pochází z Nepálu, Sikkimu a Bhútánu. Roste v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky až 35m. Mladé větve jsou plstnaté, šedohnědé. Listy jsou variabilní, obvekle podlouhlé až úzce vejčité nebo vejčitěeliptické, špičaté, na bázi kulaté nebo špičaté či široce klínovité, ostře pilovité, horní strana tmavězelená, lesklá, spodní modrozelená, v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 10 - 25 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 3 - 5cm a celková délka je 12 - 45cm. Samčí květenství má hnědožluté plstnaté veřetena, jsou samostatné, úžlabní. Samičí jsou krátké, 3 - 4květé. Plodí po 1 - 4ks. Číšky jsou dlouhé 2,5 - 3,5cm a široké 5 - 6,5cm. Žaludy široké až 3,5cm a jsou téměř celé schované v číškách.

<https://www.rostliny.net/>