

Ratibida columnifera

synonyma: *Lepachys columnaris*, *Lepachys columnifera*, *Obeliscaria columnaris*, *Ratibida columnaris*, *Ratibida columnaris* var. *pulcherrima*, R. var. *pulcherrima*, *Rudbeckia columnaris*, *Rudbeckia columnifera*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Louisiana, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, S Mexiko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste od jižní Kanady přes USA po severní Mexiko. Patří mezi trvalky a bylinky. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 0,8 (i 1,2)m. Pod zemí vytváří kůlový kořen. Střídavé listy jsou 1 - 2x zpeřené z 3 - 14 čárkovitých 1 - 16mm širokých úkrojků. Celkem jsou dlouhé 2 - 15cm, široké 0,8 - 6cm a mají tečkovitě žláznatý povrch. Na jedné rostlině naleznete 1 - 15 úborů se žebernatými stopkami o délce 6,5 - 45cm. Obvodové okvětní lístky mají žlutou barvu, vnitřní terč je hnědozelený nebo i načervenalý. Plodem je válcovitá nažka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *pulcherrima* - hnědočervené květy se žlutým lemem

Roste v preriích, pláních a nyní i při okrajích cest. Je plně mrazuvzdorná.

<https://www.rostliny.net/>