

Lonicera nigra (Zimolez černý)

synonyma: *Caprifolium nigrum*, *Chamaecerasus nigra*, *Euchylia nigra*, *Lonicera barbinervis*, L. subsp. *barbinervis*, L. var. *barbinervis*, *Xylosteon nigrum*

čeleď: *Caprifoliaceae*

oblasti: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Jilin, Katalánsko, Korea, Německo, Polsko, Pyreneje, Rakousko, Rumunsko, S Itálie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina

Roste v Číně, Koreji, střední, jižní a západní Evropě v podobě opadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1,5 (i 2)m. Větvičky mají bílou dřev, jsou holé nebo žláznatě ochlupené, zimní pupeny mají několik párů vnějších šupin, pupeny jsou úzce kuželovité, špičaté, žlutohnědé, holé a dlouhé 2 - 4mm. Listy jsoubledězelené, na spodní straně sivozelené, eliptické až podlouhlé až eliptickykopinaté, dlouhé 1,5 - 7cm, široké 1 - 2,8cm, tenké papírovité, holé, na spodní straně mohou mít chomáčky chloupků, v mládí z obou stran, báze široce klínovitá až zaoblená, konec špičatý (i přitupělý) a řapíky jsou dlouhé 2 - 4 (i 8)mm. Květy mají stopky délky 1,5 - 3cm, listeny kopinaté, malé, 1/2 délky kališní trubky, listeny pohárkovité, žláznatě brvitě, sousedící 2 kališní trubky oddělené, laloky široce kopinaté, velké 1mm, žláznatě brvitě, koruna 2pyská, červená, bleděružová nebo nafialovělá, dlouhá 0,8 - 1,1cm, uvnitř drobně ochlupená, korunní trubka kratší cípů, horní pysk vzpřímený, rozeklaný na eliptické tupé laloky. Plodem je černá až modročerná modře ožíněná kulovitá bobule šířky 5 - 9mm a obsahuje podlouhlá nebo vejčitá nahnědlá semena délky 2,5 - 4mm. Je jedovatý.

Vyhovují mu horské listnaté lesy, strže, stinné křoviny, atp. ve stínu. Půda by měla být vlhká, kyselá a bohatá na živiny.

<https://www.rostliny.net/>