

Stetsonia (Stetsonie)

čeleď: Cactaceae

Existuje pouze 1 druh. Rodové jméno bylo vybráno na počest Francise Lynde Stetsona z New Yorku, který byl právníkem a zahradnickým nadšencem.

Stetsonia coryne (Stetsonie palicovitá)

synonyma: *Cereus chacoanus*, *Cereus coryne*

oblasti: Bolívie, Paraguay, SZ Argentina

Vyskytuje se v severozápadní Argentíně, Bolívii a Paraguayi. Od báze dřevnatí. Stonek má stromovitý růst se silnými větvemi, je článkovitý a šedozelený. Dorůstá výšky 5 - 8 (i 10)m. Větve mají v průměru 9 - 10cm. Články mají 8 - 9 žeber o výšce 1 - 1,5cm. Centrální trny jsou přímé, dlouhé 5 - 10cm. Kvete bílými květy o velikosti až 15cm. Otevírají se na noc, ale vydrží i přes den. Vytvářejí se od 1m výšky rostliny. Plodem je 5 - 6cm dlouh a 4cm široká kulovitá až eliptická bobule. Je zapsán v seznamu CITES.

Vyhovuje mu sucho, křoviny, kamenité svahy, atp. V našich podmínkách potřebuje plné slunce, studené zimování a nízkou zálivku. Doroste výšky 1 - 1,5m.

Množí se semeny nebo řízkováním výhonů.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/stetsonia-coryne/>

<https://www.rostliny.net/>