

Biarum (Áróník)

čeleď: Araceae

Roste od Španělska po Blízký východ včetně severní Afriky. Pod zemí vytváří zploštělé hlízy, které zatahují v období léta. Stonek je krátký a pouze podzemní. Listy se objevují na podzim, vzácně na jaře, vytváří jich až několik desítek, mívají kopinatý, eliptický nebo obvejčitý tvar bez laloků, okraj ale může být zvlněný a mají většinou i krátký řapík. Kvete na podzim před rašením listů. Existují ale druhy, které kvetou až na jaře v době zatahování listů. Květy jsou jednopohlavné, na palici jsou v přízemí nejdříve samčí, následuje pás jalových samičích a pak nejalové samičí, spodní část toulce bývá baňkovitá a částečně zanořená v půdě. Může vydávat sladké či naopak nepříjemné aroma. Plodenství tvoří eliptické bobule v barvě bílé, narůžovělé nebo bledě růžovofialové.

Potřebuje teplou dobře propustnou půdu.

Množí se dceřinými hlízkami.

Biarum aleppicum

Biarum angustatum

synonyma: Ischarum angustatum

Biarum auraniticum

Biarum bovei

synonyma: B. homaid, Caladium bovei, Homaida bovei, Ischarum bovei, Ischarum homaid

oblasti: Írán, Izrael, Libanon, Turecko

Roste v Turecku, Libanonu, Izraeli a Íránu. Dorůstá výšky 10cm. Pod zemí vytváří 1/2kulatou hlízu. Listy jsou podlouhlé. Květenství má tmavězelený až tmavěhnědý toulec.

Biarum carduchorum

synonyma: B. carduchorum var. platyspathum, B. platyspathum, B. platyspathum var. bakhtyarum, Cyllenium carduchorum, Homaida carduchorum

oblasti: Írán

Biarum carratracense

synonyma: Arum carratracense, B. bovei subsp. haenseleri, B. haenseleri, B. intermedium, B. tenuifolium var. latifolia, Ischarum haenseleri

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (10 -) 13 - 40cm.

Biarum crispulum

synonyma: Arum carsaamii, B. bovei var. carsaamii, B. orientale, Calla orientalis, Ischarum crispulum

Biarum davisii

oblasti: Kréta, Turecko

Pochází z Kréty a Turecka. Listy jsou dlouhé několik cm a mají větší šířku než délku. Toulec je téměř srostlý, vakovitý, dlouhý do 10cm, barvy béžové až světle růžové s tmavými skvrnami a přívěskem kratším než je délka toulce, palice je tmavá, úzká a krátká.

Biarum dispar

synonyma: B. bovei f. longifolium, B. bovei subsp. dispar, B. bovei var. macroglossum, B. bovei var. purpureum, B. bovei var. rupestre, B. bovei var. viride, B. bovei var. zanonii, B. longifolium, B. macroglossum, B. numidicum, B. rupestre, Ischarum dispar

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá výšky 10 - 30cm.

Biarum ditschianum

Nad zemí se objevuje pouze pouze válcovitý přívěšek toulce.

Biarum eximium

synonyma: Homaida eximia, Ischarum eximium

Biarum fraasianum

synonyma: Ischarum fraasianum

Biarum kotschyi

synonyma: Ischarum kotschyi

Biarum marmarisense

synonyma: B. davisii subsp. marmarisense

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v západním Turecku. Toulec je téměř srostlý, vakovitý, barvy béžové s tmavými skvrnami a přívěskem kratším než je délka toulce.

Biarum mendax

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 12 - 22cm.

Biarum olivieri

synonyma: B. alexandrinum, Homaida olivieri, Ischarum alexandrinum, Ischarum olivieri, Leptopetion alexandrinum

Biarum pyrami

synonyma: Homaida pyrami, Ischarum pyrami

Biarum rhopalospadix

synonyma: B. spruneri, Cyllenium spruneri, Homaida spruneri, Ischarum spruneri

Biarum straussii

oblasti: Írán

Biarum syriacum

synonyma: Arum syriacum, Homaida russelliana

Biarum tenuifolium (Áróník tenkolistý)

synonyma: Arum tenuifolium, Homaida tenuifolia, Stenurus tenuifolium

oblasti: Andalusie, Balkánský poloostrov, Itálie

Roste ve Španělsku, Itálii a na Balkáně. Dorůstá výšky 13 - 30cm. Listy bývají úzké, trávovité. Květenství tvoří palice délky až 25cm a přesahuje toulec, vlastní toulec je na vnější straně nazelenalý a vnitřní strana je hnědozelená až hnědá. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. abbreviatum
- subsp. arundanum/B. arundanum
- subsp. galianii
- subsp. tenuifolium (Áróník tenkolistý pravý)
- subsp. zelebori

Vyhovují mu kamenitá místa na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>