

Ulmus thomasi (Jilm Thomasův)

čeleď: Ulmaceae

oblasti: Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Tennessee, Vermont, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na severovýchodě a středu Severní Ameriky v podobě opadavého stromu se symetrickou vejčitékulovitou hustou korunou. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 30)m a šířky 6 - 10m. Vnitřní kůra je žlutá. Větve jsou až do 2. roku ochlupené, následně vytvářejí korkovité lišty. Listy jsou eliptické, vejčité až obvejčité, špičaté, 2x pilovité, zpravidla holé, lesklé, dlouhé (2 -) 5 - 11 (i 16)cm, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenstvím je 7 - 13tičetný hrozen délky 3 - 5cm. Plodem je eliptická 2cm dlouhá nažka se semenem umístěným nad středem, okraj je ztlustlý a ochlupený.

<https://www.rostliny.net/>